

## Intranet – Traitement ANTI-TNF ALPHA

### Molécules disponibles :

- Infliximab - Rémicade®
- Adalimumab - Humira®
- Etanercept - Enbrel®

### Indications en Médecine Interne :

- Vascularites
- Polychondrite atrophiante
- Maladie de Still de l'adulte
- Syndromes auto-inflammatoires

### Posologie et voies d'administration :

- Infliximab :
  - + Voie intraveineuse lors d'un hôpital de jour
  - + 3 à 5 mg/kg
- Adalimumab :
  - + Voie sous-cutanée
  - + Réalisable par le patient
  - + 40 mg toutes les 2 semaines
- Etanercept :
  - + Voie sous-cutanée
  - + Réalisable par le patient
  - + 25 à 50 mg, 2 fois par semaine

### Effets secondaires :

- Infections
- Réactions aux points d'injection pour les formes sous cutanées
- Diminution des globules blancs, anémie

### Contre-indications :

- Grossesse (contre-indication relative)

- Infections évolutives, en particulier tuberculose
- Insuffisance cardiaque sévère

**Précautions d'emploi :**

- Allaitement possible sous Infliximab et Etanercept
- Vaccinations à jour avant le début du traitement
- Vaccin annuel antigrippal conseillé
- Vaccins à virus vivants contre-indiqués